

2022 – SML – Sorties mycologiques – Compte-rendu

Date	Dimanche 06 novembre 2022
Lieu	Laurière (87370) Bois près du Lac du Pont à l'Âge
Cadre	Animation culturelle orientée nature
Organisateurs	Association Nature et Patrimoine d'Ambazac & Société Mycologique du Limousin
Activités	Matin : excursion dans les bois Après-midi : détermination et exposition dans la Salle des Jeunes
Météo	Belle journée agréable mais fraîche pour la balade matinale
Bilan	Sortie mycologique satisfaisante. 132 espèces recensées dont 3 nouvelles : Russula lepida var. speciosa, Spongipellis pachyodon & Hemipholiota heteroclita
11 membres SML	Michel ARDILLIER, Gérard BARTHÉLÉMY et sa fille Élisabeth, Danièle BEYEL, Christian BLANCHET, Alain BRISSARD, Serge DUNIS, Noël HUGUET, Christian JOYEUX, Vincent PAGÉS (ONF) & Julien THURION
Autre participante	Émilie CHAMMARD, ingénieure agronome, responsable de l'antenne Limousin du Conservatoire National Botanique du Massif Central

Participants

9h30 : Les participants vont se regrouper sur la Place du Général Thoumas face l'Eglise de L'Assomption de la Très Sainte Vierge.

Un peu d'humour

A noter que nombre de participants ont préféré commencer leur journée par une prière là (j'ai des noms !) →



Excursion

Participants & mycologues vont se partager en 2 groupes et se rendront :

- Un, dans les bois vers la plage et le camping du Lac de Pont à l'Âge
- L'autre, dans les bois longeant le Ruisseau de La Forêt jusqu'à la queue du Lac de Pont à l'Âge



Détermination & exposition



Déjeuner dans la Salle des Jeunes

Puis détermination et mise en place exposition



Émilie CHAMMARD et une vaillante participante (dame en bleu) ont aidé nos actifs mycologues

Quelques photos de champignons



← **Hygrophoropsis fuscosquamula**
(Fausse-girolle mouchetée)

D'apparence proche de la variété plus claire albida de l'Hygrophoropsis aurantiaca (Fausse girolle), il se distingue par son chapeau et son pied qui sont feutrés avec parfois de petites mèches
Champignon rare des milieux humides



← **Leucopaxillus paradoxus**

Les leucopaxilles blancs à lames décurrentes sont souvent difficiles à reconnaître mais celui-ci a un chapeau charnu, des lames anastomosées (qui se lient entre-elles ou se plissent avant d'arriver au pied) et une odeur aromatique très forte

Spongipellis pachyodon →

Il se distingue par ses aiguillons nettement aplatis latéralement



← **Tylopilus felleus** (Bolet amer, Bolet de fiel)

Jeune, il peut se confondre avec le Cèpe de Bordeaux ou le Cèpe d'été. Ces 2 cèpes ont sur le pied un réseau fin et blanc. Le Bolet amer, un réseau brun avec de grosses mailles en relief.

Heureusement peu courant pour les mycophages. Un exemplaire dans une poêlée de cèpes et tout est à jeter.