



# Calocera furcata (Fr.) Fr., 1827

## Calocère fourchée

Division : Basidiomycota                      Classe : Dacrymycetes  
Ordre : Dacrymycetales                      Famille : Dacrymycetaceae

### **Introduction :**

**Habitat :** bois de **conifères**, pousse sur résidus de bois morts enfouis ou non sous des mousses

**Découvertes :** 11/12/2024 Henri NOGUÈRE, lieu-dit Les Jalonneaux, Laurière (87), sur débris d'épicéas enfouis profondément dans les mousses

### **Étude macroscopique :**

**Carpophore :** fructification **élastique** de couleur jaune ou orange, de 0.5 à 30 mm (sur bois morts) jusqu'à 80 mm de long car la hauteur peut varier en fonction du biotope (*voir photo dans des hautes mousses ci-dessous*), et 0,12-0,2 mm d'épaisseur, simple ou fourchée à 30 mm en-dessous du sommet. Base avec des poils blancs.



12/11/2024 Photo Henri NOGUÈRE



# Calocera furcata (Fr.) Fr., 1827

## Calocère fourchée

### Étude microscopique d'Henri NOGUÈRE :

Spores 8-14 x 3-5 µm, presque cylindriques ou peu arquées, lisses et incolores, avec **1 à 3 cloisons à maturité**



### Confusions possibles :

**Calocera cornea** est une espèce fréquente et visible toute l'année, à fructification **coriace** un peu grasse au toucher, carpophore simple, qui pousse sur **feuillus** et dont les spores plus petites (**10 µm maxi**) n'ont **qu'une seule cloison** à maturité.

### Quelques références iconographiques et bibliographiques :

- MycoCharentes Patrice TANCHAUD [Fiche 266 941 1](#)
- GEPR 5 Guillaume EYSARTIER et Pierre ROUX page 1062
  - Guida alla determinazione dei funghi vol. 2, Jülich