



Crepidotus autochthonus J.E. Lange (1940)

Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales

Classe : Agaricomycetes
Famille : Hygrophoraceae

Habitat : 6 exemplaires, au sol, sur les mousses.

Découvertes : 10/05/2025 - Noailles (19600), Vallée Sèche - Perte de la Couze

Étude macroscopique d'Henri NOGUÈRE :


Chapeau : semicirculaire à flabelliforme à marge infléchie, finement tomenteux, blanc

Lames : adnées moyennement serrées, blanchâtre puis beige brunâtre sale.





Crepidotus autochthonus J.E. Lange (1940)



Étude microscopique d'Henri NOGUÈRE :

Spores complètement lisses, amygdali-formes de profil à ellipsoïdes de face, à paroi épaisses fortement colorée :

(7,12)7,29-8,16-8,57(9,01)

x

(4,70)4,86-5,5-5,71(5,79) µm

moy= 8,03 x 5,37 µm

qm= 1,5 [1,33-1,92]

Cheilocystides utriformes, lagéni-formes, plus ou moins étranglées parfois subcapitées

Suprapellis faiblement gélifié

Boucles dans tous les tissus



Quelques références iconographiques et bibliographiques :

- G. Consiglio & L. Setti, Il Genere Crepidotus in Europa, A.M.B., p. 149/157
- Béatrice Sinn-Irlet
- Guillaume EYSSARTIER & Pierre ROUX - GEPR 5 page 1032