



Boletus edulis Bull., 1782

Cèpe de Bordeaux

Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales

Classe : Agaricomycetes
Famille : Boletaceae

Introduction :

Les Cèpes sont des bolets reconnus pour leur **excellente comestibilité**. Il n'en existe que 4 :

Boletus aereus (Cèpe à tête noire)
Boletus aestivalis (Cèpe d'été)
Boletus edulis (Cèpe de Bordeaux)
Boletus pinophilus (Cèpe des pins)

Dans cette fiche, nous allons étudier : **Boletus edulis** (Cèpe de Bordeaux)

Étude macroscopique de Serge DUNIS :

		Cèpe de Bordeaux
		Boletus edulis
Écologie	saison de pousse	été et surtout automne
	sols	variés mais de préférence siliceux, acides
	bois	clairs de feuillus (chênes, châtaigniers) surtout sombres de hêtres et de conifères (épicéas)
	Commentaire	
Chapeau	Ø en cm	8 à 25
	aspect	charnu, convexe à marge régulière
	revêtement (couleur)	brun fauve, brun roussâtre, plus clair vers la marge
	revêtement (aspect)	lisse et mat par temps sec, lubrifié par temps humide
	marge	parfois liserée partiellement de blanc
Tubes		fins, blanchâtres puis olivâtres
Pores		petits, blancs, virant lentement au jaune verdâtre, non bleuissant
Sporée		brun olive
Pied	aspect	typiquement ventru, obèse
	couleur	brun clair
	Réseau sur le pied	fin réseau blanc sur le haut
Chair	densité	épaisse, ferme
	couleur	blanche
	sous revêtement	brune
	Commentaire	devient assez molle avec l'âge
Odeur		faible, agréable
Saveur		douce de noisette
Comestibilité		Excellent

Boletus edulis Bull., 1782

Cèpe de Bordeaux

09/11/2013 – *Boletus edulis* - Photo Noël HUGUET



24/10/2019 – *Boletus edulis*
Photo Noël HUGUET



Boletus edulis Bull., 1782

Cèpe de Bordeaux





Boletus edulis Bull., 1782

Cèpe de Bordeaux

Confusions possibles		Cèpe = bolet reconnu pour son excellente comestibilité. Il n'en existe que 4 !		
		2 cèpes avec beaucoup de points communs		ne pas confondre les cèpes d'été et de Bordeaux avec le
		Cèpe à tête noire	Cèpe des pins	Cèpe d'été
		Boletus aereus	Boletus pinophilus	Boletus aestivalis
Ecologie (bois)		clairs de feuillus (chênes, châtaigniers)	pins, sapins, épicéas, parfois sous feuillus	feuillus
Chapeau (aspect)		charnu, convexe à marge régulière	charnu, convexe	charnu, hémisphérique puis convexe
Chapeau (marge)		parfois liserée partiellement de blanc		
Tubes		fins, blanchâtres puis olivâtres	grisâtre pâle puis verdâtres	
Pores		petits, blancs puis jaunissants, olivâtres	petits, blancs devenant lentement jaune olivacé dans la vétusté	longtemps blanchâtres puis jaune verdâtre
Sporée		brun olive	brun olive	brun olive
Pied (couleur)		roux	brun rougeâtre clair, plus pâle en haut	plus clair que le chapeau
Pied (Réseau sur le pied)		blanchâtre puis brunâtre	fin, blanchâtre	blanchâtre jusqu'à la base, souvent nettement en relief
Chair	densité	ferme	ferme	assez ferme
	couleur	blanche	blanche	blanche
	sous revêtement	blanche	brun vineux	blanche
Odeur		faible	faible	faible, agréable
Saveur		douce	douce	douce
Comestible		Excellent	Excellent	Excellent

Quelques références iconographiques et bibliographiques :

- Fiches SML de Serge DUNIS