



Boletus pinophilus Pilát & Dermek, 1973

Cèpe des pins

Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales

Classe : Agaricomycetes
Famille : Boletaceae

Introduction :

Les Cèpes sont des bolets reconnus pour leur **excellente comestibilité**. Il n'en existe que 4 :

Boletus aereus (Cèpe à tête noire)

Boletus aestivalis (Cèpe d'été)

Boletus edulis (Cèpe de Bordeaux)

Boletus pinophilus (Cèpe des pins)

Dans cette fiche, nous allons étudier : **Boletus pinophilus** (Cèpe des pins)

Étude macroscopique de Serge DUNIS :

		Cèpe des pins
		Boletus pinophilus
Écologie	saison de pousse	été et automne
	sols	siliceux, acides
	bois	pins, sapins, épicéas, parfois sous feuillus
	Commentaire	Pousse plutôt dans le midi et dans l'Ouest de la France
Chapeau	Ø en cm	8 à 20
	aspect	charnu, convexe
	revêtement (couleur)	brun rouge, brun acajou
	revêtement (aspect)	sec, un peu duveteux mais lubrifié par temps humide
	marge	
 Tubes		grisâtre pâle puis verdâtres
 Pores		petits, blancs devenant lentement jaune olivacé dans la vétusté
 Sporée		brun olive
Pied	aspect	trapu, obèse
	couleur	brun rougeâtre clair, plus pâle en haut
	Réseau sur le pied	fin, blanchâtre
Chair	densité	ferme
	couleur	blanche
	sous revêtement	brun vineux
	Commentaire	
Odeur		faible
Saveur		douce
Comestibilité		Excellent

Boletus pinophilus Pilát & Dermek, 1973

Cèpe des pins



Boletus pinophilus Pilát & Dermek, 1973

Cèpe des pins





Boletus pinophilus Pilát & Dermek, 1973

Cèpe des pins

Confusions possibles		Cèpe = bolet reconnu pour son excellente comestibilité. Il n'en existe que 4 !				
		2 cèpes avec beaucoup de points communs		ne pas confondre les cèpes d'été et de Bordeaux avec le		
		Cèpe à tête noire	Cèpe des pins	Cèpe d'été	Bolet de fiel	Cèpe de Bordeaux
		Boletus aereus	Boletus pinophilus	Boletus aestivalis	Tylopilus felleus	Boletus edulis
Ecologie (bois)		clairs de feuillus (chênes, châtaigniers)	pins, sapins, épicéas, parfois sous feuillus	feuillus	feuillus	clairs de feuillus (chênes, châtaigniers) surtout sombres de hêtres et de conifères (épicéas)
Chapeau (aspect)		charnu, convexe à marge régulière	charnu, convexe	charnu, hémisphérique puis convexe	convexe puis étalé	charnu, convexe à marge régulière
Chapeau (marge)		parfois liserée partiellement de blanc				souvent liserée partiellement de blanc
Tubes		fins, blanchâtres puis olivâtres	grisâtre pâle puis verdâtres			fins, blanchâtres puis olivâtres
Pores		petits, blancs puis jaunissants, olivâtres	petits, blancs devenant lentement jaune olivacé dans la vétusté	longtemps blanchâtres puis jaune verdâtre	blanchâtres puis rose carné Les tubes brunissent au toucher	petits, blancs, virant lentement au jaune verdâtre, non bleuissants
Sporée		brun olive	brun olive	brun olive	rosâtre	brun olive
Pied (couleur)		roux	brun rougeâtre clair, plus pâle en haut	plus clair que le chapeau	brun clair, blanchâtre au sommet	brun clair
		blanchâtre puis brunâtre	fin, blanchâtre	blanchâtre jusqu'à la base, souvent nettement en relief	grossier, larges mailles, brun foncé, sur la quasi-totalité du pied	fin réseau blanc sur le haut
Chair	densité	ferme	ferme	assez ferme	assez tendre	épaisse, ferme
	couleur	blanche	blanche	blanche	blanchâtre	blanche
	sous revêtement	blanche	brun vineux	blanche		brune
Odeur		faible	faible	faible, agréable	faible	faible, agréable
Saveur		douce	douce	douce	lentement amère puis très amère	douce de noisette
Comestible		Excellent	Excellent	Excellent	non toxique immangeable	Excellent

Quelques références iconographiques et bibliographiques :

- Fiches SML de Serge DUNIS