



# **Amanita caesarea** (Scopoli) Persoon (1801)

## Oronge, Amanite des Césars

Division : Basidiomycota  
Ordre : Agaricales

Classe : Agaricomycetes  
Famille : Amanitaceae

### Introduction :

**Habitat :** Pousse en été et au début de l'automne. Espèce thermophile,. Pousse sous les chênes, les châtaigniers, dans les clairières, plutôt sur sol non calcaire.

**Découvertes :** Ce champignon était assez rare en Limousin mais le devient de moins en moins avec le réchauffement climatique.



16/11/2014 Photo Noël HUGUET

### Étude macroscopique :

**Chapeau :** Ø de 7 à 18 cm, hémisphérique puis étalé à marge striée. Revêtement luisant, rouge orange vif, portant rarement des lambeaux blancs du voile général.

**Lames :** libres, jaune pâle au début puis jaune d'or.

**Sporée :** blanche.

**Pied :** robuste, jaune, plein, puis creux. Anneau membraneux, jaunâtre. Volve en sac, ample, membraneuse, blanche.

**Chair** ferme, blanche, jaune sous le revêtement et le cortex.

**Odeur :** légère, agréable.

**Saveur :** douce.



16/11/2014 Photo Noël HUGUET



# **Amanita caesarea** (Scopoli) Persoon (1801) Oronge, Amanite des Césars

## **Comestibilité :**

**Excellent comestible**, aussi bien cuit que cru en salade, bien qu'il soit fortement conseillé de cuire tous les champignons de la nature. Ce champignon est très réputé.

## **Attention :**

La prudence nous conseille de ne pas ramasser les « œufs » des amanites comme celui de gauche sur la photo ci-contre →

16/11/2014 Photo Noël HUGUET



16/11/2014 Photo Noël HUGUET



Amanite phalloïde mortelle, et oronges comestible, cohabitant souvent et un « œuf » non ouvert peut cacher l'un ou l'autre de ces deux champignons !

Quand l'« œuf » s'est ouvert et que le chapeau orangé est visible, la cueillette peut se faire !



16/11/2014 Photo Noël HUGUET



# **Amanita caesarea** (Scopoli) Persoon (1801) Oronge, Amanite des Césars



Photo Julien THURION



28/09/2024 Photo Christian JOYEUX

## Confusions possibles :

On ne peut confondre **Amanita caesarea** (amanite des Césars ou oronge, **très bon comestible**) bien développée, qu'avec **Amanita muscaria** (amanite tue-mouches, **toxique**) surtout quand délavée par la pluie.

← **Amanita muscaria** délavée par la pluie



# Amanita caesarea (Scopoli) Persoon (1801)

## Oronge, Amanite des Césars

Une belle cueillette :

16/11/2014 Photo Noël HUGUET



|                                                         | lames<br>libres                               | Pied                                                                                         | Anneau<br>ample et<br>membraneux                                                          | volve                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amanita caesarea</b><br>Amanite des Césars<br>Oronge | <b>jaune</b> pâle au début<br>puis jaune d'or | <b>jaune</b> concolore aux<br>lames                                                          | <b>jaune</b>                                                                              | <b>blanche</b>                                                                                                                   |
|                                                         | épaisses<br>arête concolore mince             | 6-12 x 1,5 à 3 cm<br>robuste, plein                                                          | <b>strié au-dessus</b>                                                                    | en <b>forme de sac</b> ,<br>ample, membra-<br>neuse, <b>épaisse</b> , avec<br>un net bourrelet basal<br>circulaire à l'intérieur |
| <b>Amanita muscaria</b><br>Amanite tue-<br>mouches      | <b>Blanches</b><br>ou jaunes très pâle        | <b>blanc</b><br>à jaune très pâle                                                            | <b>blanc</b>                                                                              | concolore au pied                                                                                                                |
|                                                         | assez serrées avec<br>lamellules tronquées    | 8-25 cm<br>concolore aux lames<br>très floconneux à l'état<br>jeune puis sublisce<br>bulbeux | pendant en jupe,<br>persistant<br>floconneux en-<br>dessous<br><b>non strié au-dessus</b> | <b>friable</b> réduite à des<br>bourrelets floconneux<br>ou des écailles au-<br>dessus du bulbe                                  |



# **Amanita caesarea** (Scopoli) Persoon (1801) Oronge, Amanite des Césars

## Commentaires et avertissement :

**C'est un gros problème pour la consommation quand un champignon comestible est parasité par un champignon toxique.** Nous pouvons citer par exemple le **Mycogone rosea**, **toxique**, qui est redouté des producteurs de champignons de Paris (**Agaricus bisporus**) car il provoque notamment la **maladie de la môle** sur les cultures.

Dans la nature, **Mycogone rosea** parasite aussi l'oronge (**Amanita caesarea**) :

**Prudence donc avec des oronges ayant des parties roses**



Belles illustrations de ces oronges parasitées sur :

MycoCharentes de Patrice TANCHAUD ([fiche 2097](#))

et sur MycoDB : [lien](#)

## **Quelques références iconographiques et bibliographiques :**

- MycoCharentes (Patrice TANCHAUD) : [fiche 211](#)
- GEPR 5 (Guillaume Eyssartier et Pierre Roux) : page 314