



Neoboletus erythropus (Pers.) C.Hahn, 2015

Bolet à pied rouge, Récompense du mycologue

Division : Basidiomycota
Ordre : Boletales

Classe : Agaricomycetes
Famille : Boletaceae

Introduction :

Habitat : Été, automne. Terrains siliceux surtout. Bois de feuillus et de conifères.

Étude macroscopique de Serge DUNIS :

- Chapeau :** (Ø 10 à 20 cm) charnu, hémisphérique puis convexe. Revêtement brun rouge foncé, légèrement velouté. Tubes jaunâtres bleuissants.
- Pores :** petits, rouge orangé, plus jaunes vers la marge, rapidement bleu foncé au toucher.
- Sporée :** brun olivâtre.
- Pied :** robuste, un peu renflé à la base, presque entièrement moucheté par de petites peluches très serrées rouge sur fond jaune, plus nombreuses au sommet. Bleuissement au toucher. Absence de réseau.
- Chair :** très ferme, jaune vif devenant aussitôt bleu de Prusse à la coupe.
- Odeur :** faible.
- Saveur :** douce.
- Comestibilité :** **toxique cru ou mal cuit** et **excellent comestible bien cuit**. Le pied étant un peu fibreux, il vaut mieux en rejeter la moitié basse. Le bleuissement intense de la chair qui rebute les mycophages débutants, disparaît à la cuisson.
- A noter :** contrairement aux "vrais cèpes" il a la chance de n'être pratiquement jamais véreux.



←
**Neoboletus
erythropus**

Bolet à pied
rouge

**Récompense
du
mycologue**



Neoboletus erythropus (Pers.) C.Hahn, 2015

Bolet à pied rouge, Récompense du mycologue

Confusions possibles :

Neoboletus erythropus est une espèce assez typique qui paraît **difficile à confondre quand le pied est finement ponctué de rouge sur fond jaune**. Mais ce coquin de champignon peut nous présenter un phénomène néanmoins exceptionnel, de réseau rouge sur le pied et son identification devient alors moins évidente surtout pour celui qui n'est pas mycologue.

a) Deux espèces voisines :



↑ **Boletus queletii** (Bolet de Quélet – ci-dessous) possède un chapeau brun rouge ou orange et un pied sans réseau, finement ponctué. La chair bleuit à la cassure mais elle devient typiquement rouge betterave dans la base du pied. Il pousse sous les feuillus, il préfère les sols calcaires. **Toxique cru, Il ne doit être consommé que bien cuit, mais il est peu estimé.**

← **Boletus luridus** (Bolet blafard) au chapeau ocre ou brun orange, possède un pied muni d'un réseau rougeâtre sur fond jaunâtre. **A la coupe on voit une ligne noire entre pores et chair du chapeau (la ligne de Bataille)**. La chair est très bleuissante. Il préfère les terrains calcaires. Sous les feuillus. **Toxique cru, Il ne doit être consommé que bien cuit.**



Neoboletus erythropus (Pers.) C.Hahn, 2015

Bolet à pied rouge, Récompense du mycologue

b) Les confusions à surtout éviter :

Boletus calopus →

Bolet à beau pied

Chapeau : **gris clair à chamois**

Pores : **Jaune vif puis jaune olive, bleuissants au toucher**

Bas du pied : **rouge**

Haut du pied : **jaunissant + réseau jaune**

Chair : **Jaune vif, très vivement bleuissante**

Odeur : **Faible, acidulée, de vinaigre**

Saveur : **Amère**

Terrains siliceux

Pas toxique

Forte amertume qui persiste après cuisson



Toxique

← Rubroboletus satanas

Bolet Satan

Chapeau : **blanchâtre à gris mastic**

Pores : **jaunes puis vite rouge orangé à rouge sang, bleuissants,**

Pied : **jaune en haut puis rosé vif vers le bas avec un réseau concolore**

Chair : **Blanchâtre à jaunâtre, faiblement bleuissante**

Odeur : **repoussante, désagréable, de viande avariée**

Saveur : **douce**

Le bolet satan pousse sur terrain calcaire

(difficile à trouver en Haute-Vienne et Corrèze ! Plus facile en sud Corrèze, sur Le Causse)

« L'appellation « bolet **de** satan » est souvent prononcée à tort par les « promeneurs du dimanche » ou même les « casseroleurs », qui baptisent ainsi les gros bolets bleuissants de notre région » dit le mycologue Patrice TANCHAUD dont nous faisons nôtre son commentaire.

Quelques références iconographiques et bibliographiques (éventuellement) :

- Fiches SML de Serge DUNIS
- Mycocharentes Patrice TANCHAUD : [Fiche 3164](#)