

Agaricus xanthodermus Geneviev (1876)

Agaric jaunissant, Psalliote jaunissante

Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales

Classe : Agaricomycetes
Famille : Agaricaceae

Champignon blanc à lames roses = c'est un rosé ! ... Méfiance !!!

↓ **Agaricus xanthodermus, le "rosé des prés" à éliminer du panier car toxique !** ↓



Étude macroscopique de Serge DUNIS :

- Chapeau :** (Ø 6 à 12 cm) **typiquement tronconique** (de forme trapézoïdale vu de côté, ou disons aplati sur le sommet) s'étalant avec l'âge. Revêtement blanc, soyeux, **se tachant de jaune vif au frottement** (grattage avec l'ongle) **vers la marge**
- Lames :** roses puis brun pourpre
- Sporée :** brun noirâtre
- Pied :** assez long, souvent bulbeux, blanc, **jaunissant au froissement**.
- Chair :** blanche, devenant **instantanément jaune vif dans le bulbe et sous le revêtement**.
- Odeur :** **désagréable** odeur d'iode, d'encre, de phénol, **jamais anisée**
- Ecologie :** On le trouve en été ou automne, **dans les prés** (prairies) **souvent près de lisières ou de décombres**, parfois dans les jardins, et plus rarement dans les sous-bois



Agaricus xanthodermus Genevier (1876)

Agaric jaunissant, Psalliote jaunissante

Confusions :

Il existe deux variétés :

griseus au chapeau gris brunâtre
et **lepiotoïdes**, dont le chapeau squameux est de couleur brun-gris

Il avait existé une variété **meleagrioides** qui n'est plus reconnue aujourd'hui

Il existe une espèce voisine, **aussi toxique**, l'agaric pintade au chapeau couvert de fines mèches gris brunâtre, à la **chair jaunissante**, à l'**odeur d'encre, d'iode**, et qui pousse dans les bois de feuillus :

Agaricus moelleri (synonyme : **Agaricus praeclaresquamosus**),

Les 3 "rosés" qui eux, sont comestibles sont :

- **Agaricus campestris** (Agaric champêtre, le vrai rosé des prés) dont la **chair rosit**, qui a une **odeur agréable** et qui pousse dans les **prés** !
- **Agaricus sylvicola** (Agaric anisé des bois) dont la **chair jaunit**, qui a une **odeur agréable d'anis** et qui pousse dans les **bois** !
- et **Agaricus arvensis** (Agaric des jachères, Boule de neige) dont la **chair jaunit**, qui a une **odeur agréable d'anis** et qui pousse dans les **prés** !

[Tableau comparatif](#)

Les conseils au cueilleur :

Soyez attentif au lieu de récolte ! (voir ci-dessus où poussent ces 4 agarics !)

Vérifiez bien les lames : Toutes les espèces matures d'Agaricus possèdent des lamelles de couleur rose puis brune.

Ne vous fiez pas à la bague sur le pied, car chez les agarics, c'est souvent un anneau mal formé ou vite disparu.

Si les lames ne sont pas roses mais blanches, s'il y a une bague sur le pied et s'il y a une volve à la base du pied (d'où l'obligation de **toujours arracher du sol un champignon dans sa globalité** et de ne jamais le couper !) vous serez devant un champignon **très toxique voire mortel** : Amanites printanières, Amanite vireuse, forme blanche de l'Amanite phalloïde (qui pousse aussi dans les prés !), ...

Les conseils au mycophage :

De plus, quand on gratte son chapeau ou mieux son pied souvent un peu bulbeux, il jaunit mais pas toujours très bien ! Alors, comme sur la photo ci-dessus de Noël, coupez les rosés de votre cueillette, un par un, de bas en haut (*comme le champignon du milieu sur sa photo*) et **ceux qui jaunissent au bas du pied près des racines, vous les éliminez**. De plus, **on ne consomme pas cru** (comme le champignon de Paris qui est un champignon de culture) les rosés ! En les cuisant vous éviterez peut-être la douve du foie entre autres !

Quelques références iconographiques et bibliographiques :

- Fiche SML de Serge DUNIS
- Fiche MycoCharentes de Patrice TANCHAUD : [Fiche 1528](#)